

Q19. 透析患者に使われている主な薬剤について教えてください。

- A. 1) 降圧剤 2) 活性型ビタミンD製剤 3) リン吸着剤 4) カリウム吸着製剤
5) カルシウム受容体作動薬 (レグパラ) 6) エリスロポエチン
7) その他 (抗血小板薬、抗凝固薬、循環器系薬剤、消化器系薬剤、抗菌薬、消炎鎮痛薬、緩下剤など)
などがあります。

1) 降圧剤

主に下記の作用機構の異なる降圧薬を、単独または組み合わせて使用します。

- カルシウム拮抗薬
- ACE阻害薬 (アンジオテンシン変換酵素阻害薬)
- ARB (アンジオテンシンII受容体拮抗薬)
- β 遮断薬
- α 遮断薬
- 中枢性降圧薬
- その他

2) 活性型ビタミンD製剤 (カルシウム・リン代謝、骨代謝にかかわる)

- 内服薬【アルファロール、ロカルトロール、フルスタン®】
- 注射薬 (ビタミンD静注パルス療法)【オキサロール注、ロカルトロール注®】

3) リン吸着薬 (消化管内で食物に含まれるリンを吸着して、便として排泄する)

【炭酸カルシウム、レナジェル、フォスブロック、キックリン、ホスレノール®】

4) カリウム吸着薬【ケイキサレート、カリセラムNa、アーガメート®】

5) カルシウム受容体作動薬 (副甲状腺ホルモン値を抑制する)【レグパラ®】

6) エリスロポエチン (造血ホルモン・赤血球を作る)

【エポジン、エスポー、エポエチン α 、ネスプ、ミルセラ®】

7) その他

循環器系薬剤 (虚血性心疾患用薬、抗不整脈薬)

抗血小板薬 (アスピリンなど)、抗凝固薬【ワーファリン®】

消化器系薬剤 (H2ブロッカー、PPI、粘膜保護薬など)

抗菌薬 (細菌感染症などに対して使用)

消炎鎮痛薬 (痛み止め、解熱薬)

緩下剤

など