

Q49. 透析患者に使われている主な薬剤について教えてください

A.

- 1) 降圧剤
- 2) 活性型ビタミンD製剤
- 3) リン吸着剤
- 4) カリウム吸着製剤
- 5) カルシウム受容体作動薬
- 6) エリスロポエチン
- 7) HIF-PH阻害薬
- 8) その他（抗血小板薬、抗凝固薬、循環器系薬剤、消化器系薬剤、抗菌薬、消炎鎮痛薬、緩下剤・・・）などがあります。

1) 降圧薬

主に下記の5つの作用機構の異なる降圧薬を、単独または組み合わせて使用する

- ・カルシウム拮抗薬
- ・ACE阻害薬（アンジオテンシン変換酵素阻害薬）
- ・ARB（アンジオテンシンII受容体拮抗薬）
- ・β遮断薬
- ・α遮断薬
- ・中枢性降圧薬
- ・その他

2) 活性型ビタミンD製剤（カルシウム・リン代謝、骨代謝にかかわる）

- ・内服薬 [アルファロール、ロカルトロール、フルスタン]
- ・注射薬（ビタミンD静注パルス療法） [オキサロール注、ロカルトロール注]

3) リン吸着薬（消化管内で食物に含まれるリンを吸着して、便として排泄する）

[炭酸カルシウム、レナジェル、フォスブロック、キックリン、ホスレノール]

4) カリウム吸着薬 [ケイキサレート、カリセムラ Na、アーガメート、ロケルマ]

5) カルシウム受容体作動薬（副甲状腺ホルモン値を抑制する） [レグパラ、パーサビブ、オルケディア]

6) エリスロポエチン（造血ホルモン・赤血球を作る）

- ・注射薬 [エポジン、エスポー、エポエチンα、ネस्प、ミルセラ]

7) HIF-PH阻害薬 [エベレンゾ、ダーブロック、エナロイ、マスーレッド、バフセオ]

8) その他

循環器系薬剤（虚血性心疾患用薬、抗不整脈薬）、

抗血小板薬（アスピリンなど）、抗凝固薬 [ワーファリン]

消化器系薬剤（H2ブロッカー、PPI、粘膜保護薬など）

抗菌薬（細菌感染症などに対して使用）

消炎鎮痛薬（痛み止め、解熱薬）

緩下剤

など